

# Note tecniche – rilevazione di medicinali molto costosi nella Statistica medica degli stabilimenti ospedalieri dell'Ufficio federale di statistica (UST) nell'anno 2019

## 1 Introduzione

Per la rilevazione dei medicinali molto costosi nella Statistica medica degli stabilimenti ospedalieri dell'Ufficio federale di statistica (UST) valgono fondamentalmente le attuali Direttive di rilevazione SwissDRG, in special modo le direttive della lista dei medicinali e delle sostanze rilevabili nella Statistica medica.

## 2 Estensione

Nella Statistica medica vanno rilevati tutti i medicinali e le sostanze dispensati secondo la lista dei medicinali e delle sostanze rilevabili nella Statistica medica per il 2019.

Nel segmento dati complementari sui gruppi di pazienti (MD) sono disponibili a questo scopo quattordici campi per l'inserimento di medicinali:

<i>Va. N.</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Definizione</i>	<i>Lunghezza max.</i>	<i>Tipo</i>
4.8.V02	Medicamento 1	Vedi definizione nel capitolo 3	50	AN <sup>1</sup>
4.8.V03	Medicamento 2	Idem	50	AN
4.8.V04	Medicamento 3	Idem	50	AN
4.8.V05	Medicamento 4	Idem	50	AN
4.8.V06	Medicamento 5	Idem	50	AN
4.8.V07	Medicamento 6	Idem	50	AN
4.8.V08	Medicamento 7	Idem	50	AN
4.8.V09	Medicamento 8	Idem	50	AN
4.8.V10	Medicamento 9	Idem	50	AN
4.8.V11	Medicamento 10	Idem	50	AN
4.8.V12	Medicamento 11	Idem	50	AN
4.8.V13	Medicamento 12	Idem	50	AN
4.8.V14	Medicamento 13	Idem	50	AN
4.8.V15	Medicamento 14	Idem	50	AN

Per informazioni più dettagliate sulla Statistica medica consultare la homepage dell'Ufficio federale di statistica (UST).

<sup>1</sup> AN = alfanumerico

### 3 Definizione


#### 3.1 Variabili/segmenti<sup>1)</sup>

Seg.	Lun- ghez- za max.	Campo obbli- gatorio	Variabile	Campo di valori
a	7	Sì	Codice ATC (a 7 posizioni)	Tutti i codici ATC conformemente alla lista dei medicinali e delle sostanze rilevabili nella Statistica medica per il 2019.
b	4	Sì <sup>2)</sup>	Informazioni supplemen- tari da codifi- care	<p>Preparati:</p> <p><u>Abbr.</u>    <u>Denominazione</u>            CVT = Ventavis<sup>®</sup> (Inalatorio)            CAI<sup>4</sup> = Alprolix<sup>®</sup> / Idelvion<sup>®</sup> / Refixia<sup>®</sup>            CBB<sup>5</sup> = Benefix<sup>®</sup> / Berinin P<sup>®</sup> / Immunine STIM Plus<sup>®</sup> / Rixubis<sup>®</sup>            CZC<sup>6</sup> = Zavicefta<sup>®</sup> (2g Ceftazidime/0.5g Avibactam)            CZB<sup>6</sup> = Zerbaxa<sup>®</sup> (1g Ceftolozane/0.5g Tazobactam)            CHV<sup>6</sup> = Harvoni<sup>®</sup> (400mg Sofosbuvir/90mg Lédirasvir)            CVK<sup>6</sup> = Viekirax<sup>®</sup> (12.5mg Ombitasvir/75mg Paritaprèvir/50mg Ritonavir)            CZR<sup>6</sup> = Zepatier<sup>®</sup> (50mg Elbasvir/100mg Grazoprèvir)            CEP<sup>6</sup> = Epclusa<sup>®</sup> (400mg Sofosbuvir/100mg Velpatavir)            CVO<sup>6</sup> = Vosevi<sup>®</sup> (400mg Sofosbuvir/100mg Velpatasvir /100mg Voxilaprèvir)            CMA<sup>6</sup> = Maviret<sup>®</sup> (100mg Glècaprèvir/40mg Pibrentasvir)            CLS<sup>6</sup> = Lonsurf<sup>®</sup> (15mg Trifluridine/6.14mg Tipiracil)            CCA = Caelyx<sup>®</sup>            CTG = Thymoglobuline<sup>®</sup>            CFR = ATG-Fresenius<sup>®</sup> / Grafalon<sup>®</sup>            CZY = Zypadhera<sup>®</sup>            CRC = Risperdal Consta<sup>®</sup>            CAM = Abilify Maintena<sup>®</sup>            CXE = Xeplion<sup>®</sup> / Trevicta<sup>®</sup>            COK<sup>6</sup> = Orkambi<sup>®</sup> (200mg Lumacaftor/125mg Ivacaftor)</p> <p>Altri:</p> <p><u>Abbr.</u>    <u>Denominazione</u>            Rec = ricombinante            Plas = plasmatico            Susp = sospensione            Tab = compressa / capsula</p>
c		Sì	Modo di som- ministrazione	<p><u>Abbr.</u>    <u>Denominazione</u>            ET = endotracheopolmonare            IL = intralesionale            IM = intramuscolare            IMPL = impianto            Inhal = inalazione            IT = intratecale            IV = endovenoso            IVITR = intravitreale            N = nasale            O = orale            R = rettale            SL = sublinguale/buccale            SC = sottocutaneo            T = topico            TD = transdermico            VAG = vaginale            U = uretrale</p>

d	18	Sì	Dose <sup>3)</sup>	Numero razionale tra 0 e 999999999999999999 (10 <sup>18</sup> -1), senza separatori delle migliaia, numeri decimali con punto (ASCII 46).														
e	3	Sì	Unità	<table border="0"> <tr> <td><u>Abbreviazione</u></td> <td><u>Denominazione</u></td> </tr> <tr> <td>mcg</td> <td>= microgrammo</td> </tr> <tr> <td>mg</td> <td>= milligrammo</td> </tr> <tr> <td>g</td> <td>= grammo</td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>= unit</td> </tr> <tr> <td>UD</td> <td>= unit dose<sup>7)</sup></td> </tr> <tr> <td>AN</td> <td>= applicazione</td> </tr> </table>	<u>Abbreviazione</u>	<u>Denominazione</u>	mcg	= microgrammo	mg	= milligrammo	g	= grammo	U	= unit	UD	= unit dose <sup>7)</sup>	AN	= applicazione
<u>Abbreviazione</u>	<u>Denominazione</u>																	
mcg	= microgrammo																	
mg	= milligrammo																	
g	= grammo																	
U	= unit																	
UD	= unit dose <sup>7)</sup>																	
AN	= applicazione																	

- 1) Utilizzare come separatore il punto e virgola (ASCII 59) tra i singoli segmenti e la barra verticale (ASCII 124) tra le variabili.
- 2) Campo obbligatorio a condizione che sia richiesto e pertinente conformemente alla lista dei medicinali e delle sostanze rilevabili nella Statistica medica per il 2019, nella colonna "Informazioni supplementari da codificare". Altrimenti questo campo rimane vuoto.
- 3) Secondo il manuale di codifica, vanno sommate le dosi per ogni caso con lo stesso codice ATC, le stesse informazioni supplementari e lo stesso modo di somministrazione. **In ogni caso solo il dosaggio amministrato deve essere dichiarato.**
- 4) I preparati con un'emivita media  $\geq 70$  ore vanno codificati con la stessa abbreviazione usata per i preparati indicati.
- 5) I preparati con un'emivita media  $< 70$  ore vanno codificati con la stessa abbreviazione usata per i preparati indicati.
- 6) I preparati combinati con un altro nome commerciale ma con la stessa composizione vanno codificati con la stessa abbreviazione del preparato indicato.
- 7) **L'unità «unit dose» deve essere indicata per le preparazioni combinate. Definisce il numero di dose et quindi il numero d'unità della preparazione somministrata (per esempio 1 compressa).**

### 3.2 Esempio di rilevazione del record di dati



### 3.3 Integrazioni alla registrazione delle terapie cellulari CAR-T

Questa informazione riguarda solo alcuni ospedali. Se tecnicamente possibile, le terapie cellulari CAR-T devono essere somministrate come un medicamento. I codici di analogia corrispondenti figurano nella lista dei medicinali. Questi casi devono essere inoltre registrati anche nella rilevazione dettagliata. Per ulteriori dettagli si veda la rilevazione dettagliata.

## 4 Contatto

### SwissDRG SA

Beatrice Balmer  
Dipartimento di Economia

Tel.: +41 31 310 05 50

E-mail: [datenerhebung@swissdrg.org](mailto:datenerhebung@swissdrg.org)

Versione:	Data:	Variazione, stato:
V8.0	11.01.2019 08.03.2019	Supplemento al punto 3.1: nota in calce «unit dose» Adeguamento al punto 3.1: composizione Harvoni® Supplemento al punto 3.1: Supplemento alla nota 3 Adeguamento al punto 3.1: Adeguamento dell' emivita media alle note 4 e 5 Adeguamento al punto 3.1: Supplemento Refixia®